LOS REPTILES

Lagartija de abanico blanco Siik



Anolis laeviventris

Cuerpo de color marrón grisáceo, con papada o abanico blanquecino.

LRC 52 mm

UICN LC (Preocupación menor)
LEA 3 (Vulnerable)

Lagartija de abanico de Rodríguez Siik



Anolis rodriguezii

Cuerpo de color marrón grisáceo, con papada o abanico naranja, con el área basal más oscura.

LRC 49 mm

UICN LC (Preocupación menor)
LEA No evaluada

Lagartija de abanico de Cobán Siik



Anolis cobanensis

Cuerpo de color marrón grisáceo, con papada o abanico morado.

LRC 50 mm

UICN VU (Vulnerable)
LEA 3 (Vulnerable)

Lagartija, cutete Siik



Lepidophyma mayae

Lagartija de tamaño mediano con escamas rugosas y pequeñas protuberancias que le dan una apariencia única. Vive escondida entre troncos caídos, rocas, cuevas y otros refugios del bosque, por lo que rara vez es observada. Tiene hábitos nocturnos.

LRC 65 mm

UICN NT (Casi amenazada)
LEA No evaluada

Pasarríos/Basilisco marrón



Basiliscus vittatus

Existen solo 4 especies conocidas en el mundo, y *B. vittatus* es la que se encuentra en Guatemala. Tienen la habilidad de correr sobre la superficie del agua con sus patas traseras.

LRC 170 mm

UICN LC (Preocupación menor)
LEA No evaluada

Culebra cafetalera de collar Ak



Ninia diademata

Serpiente pequeña, esquiva e inofensiva. Color negro, con un collar de escamas entre rojo, naranja y amarillo. Parte inferior del cuerpo blanquecino con triángulos invertidos negros iridiscentes.

LRC 421 mm

UICN LC (Preocupación menor)
LEA No evaluada

Culebra de café de espalda roja, dormilona, coralillo falso / Ak



Ninia sebae

Serpiente pequeña y delgada que generalmente mide entre 20 y 40 cm de longitud. Se reconoce por su coloración rojiza o café rojiza en el dorso y por su vientre más claro, tiene manchas oscuras en el dorso. No es venenosa.

LRC 386 mm

UICN LC (Preocupación menor)
LEA No evaluada

Tortuga tres filos, tres quillas, mordedora / Kok



Staurotypus triporcatus

Es una tortuga de agua dulce por lo que habita en ríos, lagunas y humedales. Se reconoce fácilmente por las tres crestas o "quillas" que recorren su caparazón y por su cabeza grande y robusta. Tiene un rostro moteado con manchas blancas.

LRC Largo del caparazón: 25-35 cm en adultos

UICN VU (Vulnerable)
LEA 2 (En peligro)

GUÍA RÁPIDA de identificación

REPTILES



&

ANFIBIOS



del territorio POQOMCHI'

CONSERVATION LEADERSHIP PROGRAMME

¿CÓMO USAR ESTA GUÍA?

Esta guía reúne una selección de especies de ***anfibios y reptiles*** observadas en **San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.**

En el municipio se **han observado 66 especies,** siendo cada vez más difícil encontrarse con ellas ya que enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat por cambio de uso de suelo, muertes por encuentros con humanos y son vulnerables al cambio climático.

Si te encuentras con un animal, RECUERDA:

1. Observa sin manipular al individuo. Son animales muy sensibles. La piel de los anfibios les ayuda a respirar, y puede dañarse con sustancias presentes en nuestras manos.
2. Compara su color, forma y tamaño con las fotografías.
3. Sé curioso y observador. Cada animal es diferente y tiene comportamientos únicos.
4. Lee la descripción para confirmar su identificación.

Abreviaturas

UICN — **Estado de conservación global,** según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

LEA — **Listado de Especies Amenazadas** de Guatemala. Estado de conservación nacional.

LRC — **Longitud rostro-cloaca** (medida desde la punta del hocico hasta la cloaca).

LOS ANFIBIOS

Sapo de Caña / Jukuk



Rhinella horribilis

Es el sapo más grande de toda Centroamérica. Suele asociarse con hábitats abiertos y perturbados.

LRC: **85-145 mm (machos) 90-175 mm (hembras)**

UICN: LC (Preocupación menor)
LEA: No evaluada

Sapo amarillo / Jukuk



Incilius luetkeni

Sapo grande. Los machos suelen ser amarillo verdoso, mientras que las hembras tienen tonos café u olivo con líneas claras.

LRC: **77- 96 mm (machos) 73-107 mm (hembras)**

UICN: LC (Preocupación menor)
LEA: No evaluada

Rana Leopardo / Roch



Lithobates macroglossa

Rana grande con manchas oscuras sobre el dorso y patas traseras con membranas, adaptadas para desplazarse en el agua.

LRC: **61–78 mm (machos) 71-88 mm (hembras)**

UICN: LC (Preocupación menor)
LEA: 3 (Vulnerable)

Rana Verde de ojos negros / Roch



Agalychnis moreletii

Rana arborícola llamativa por el iris de sus ojos (color granate al rojo oscuro). Costados del cuerpo y en la parte anterior y posterior de sus patas de color naranja.

LRC: **51–66 mm (machos) 71-83 mm (hembras)**

UICN: LC (Preocupación menor)
LEA: 2 (En Peligro)

Rana arborícola común / Roch



Smilisca baudinii

Rana de color verde, café o gris, con manchas oscuras, ojos grandes y discos adhesivos en los dedos que le permiten trepar.

LRC: **76 mm (machos) 90 mm (hembras)**

UICN: LC (Preocupación menor)
LEA: No evaluada

Rana de quebradas / Roch



Ptychohyla hypomykter

Rana arborícola de color café, gris o verdoso, con discos adhesivos en los dedos y vientre claro; vive en la vegetación cercana a quebradas.

LRC: **61–78 mm (machos) 71-88 mm (hembras)**

UICN: VU (Vulnerable)
LEA: No evaluada

Salamandra de lengua de hongo de Cobán *N/E*



Bolitoglossa helmrichi

Dorso de coloración café oscura con patrones amarillos variables, la parte inferior de la cola suele ser amarilla o anaranjada, con dedos ampliamente palmeados.

LRC: **47 mm (machos) 56 mm (hembras)**

UICN: VU (Vulnerable)
LEA: 3 (Vulnerable)

Salamandra de lengua de hongo de Müller *N/E*



Bolitoglossa mulleri

Dorso del cuerpo y cola de color negro con una franja vertebral pálida, estrecha y conspicua de color naranja amarillenta, o completamente negras.

LRC: **80 mm**

UICN: VU (Vulnerable)
LEA: 2 (En Peligro)

Salamandra platanera del norte *N/E*



Bolitoglossa rufescens

Pequeña de color café rojizo, con cola corta y dedos completamente palmeados; suele presentar una franja café oscura que se extiende desde los ojos hacia el cuerpo.

LRC: **36 mm**

UICN: LC (Preocupación menor)
LEA: No evaluada